

こ ほんしや かた
お子さまと保護者の方へ

しんがた
新型コロナウイルス コミナティを

せつしゆ こ ほんしや かた
接種されるお子さまと保護者の方へ



かあ とう ひと いっしょ
お母さん、お父さん、おうちの人と一緒に
せつめいしよ よ し
この説明書を読んで、ワクチンのことを知っておきましょう。

保護者の方へ：保護者の方もお子さまと一緒に5～11歳のお子さま向けページ
(2～5ページおよび裏表紙)をご確認ください。

たい しょう ねん れい 対象年齢	かげつ さい 6か月～11歳
たいしょう 対象ワクチン	• コミナティ筋注(5～11歳用) • コミナティ筋注(6か月～4歳用)

12歳以上の方に関する情報は、
「コミナティを接種される方とそのご家族へ」をご確認ください。
※6か月～4歳のお子さまを対象とした情報は栗色を、
5～11歳のお子さまを対象とした情報はオレンジを基調として作成し、
色調で対象年齢を判別できるようにしております。




さいいじょう 5歳以上のみなさんへ しんがた 新型コロナ

しんがた どうして新型コロナワクチンを受けるの？

しんがた 新型コロナワクチンを受けることで、ウイルスが体にはいつても新型コロナにかかりにくくなります。もしかかって、新型コロナの症状が重くなることが少なくなります。

しんがた 新型コロナワクチンにはどんな効き目があるの？

わたし からだ もともと私たちの体には、ウイルスがはいつてきたときに、どんな敵かをおぼえておいて、次にはいつてきたら、すぐにたたかうことができる仕組みがあります。新型コロナワクチンはこの仕組みを利用したものです。ワクチンにはウイルスの情報がはいつています。その情報を使って、私たちの体は最初からウイルスがどんな敵かを知っていて、すぐにたたかうことができる仕組みを準備することができます。この仕組みによって、ウイルスが体にはいつてきたとしても新型コロナにかかりにくくなり、もしかかって、症状が重くなることが少なくなります。十分な仕組みができるまでには、2回目のワクチンを受けてから7日間ぐらいかかります。



しんがた 新型コロナワクチンは何回受けるの？

さいいじょう 5歳以上のみなさんは、1回目のワクチンを受けた後、日にちを3週間あけて、2回目のワクチンを受けます。2回目のワクチンを受けてから少なくとも5か月あけて、3回目のワクチンを受けることができます。



ワクチンってどんなワクチン？

新型コロナワクチンを受けるとき、どんなことに気をつければいいの？

受ける前に気をつけること

37.5℃以上の熱があるときは、ワクチンを受けることはできません。いつもと体の調子がちがうと思ったら、お母さん、お父さん、周りの大人の人に伝えましょう。



受けた後に守ってほしいこと

しばらくはすわって
ゆっくり待つ



ワクチンを受けた後はすぐに帰らずに、イスにすわってしばらくはゆっくり待ちましょう。何か気になることがあれば、お母さん、お父さん、周りの大人の人に伝えましょう。

注射した部分は
さわらない



さわったりこすったりしないようにしましょう。お風呂にはいつでもいいですが、ワクチンを注射した部分はゴシゴシ洗わないようにしましょう。

ゆっくり過ごす



ワクチンを注射した日はいつでもおりに過ごしても大丈夫ですが、はげしい運動はやめましょう。いつもと体の調子がちがうときは、お母さん、お父さん、周りの大人の人に相談しましょう。

ワクチンを受けた後、手足の先がピリピリする、手足に力がはいらぬといったことがあれば、お母さん、お父さん、周りの大人の人にすぐに知らせることが大切です。

4ページと5ページにも気をつけてほしいことが書いてあります。このページとあわせて読んでおきましょう。

さいいじょう 5歳以上のみなさんへ ワクチンを

ワクチンを受けると時々、痛みやだるさや熱のような症状が出る場合があります

受けた後に出るかもしれない重い症状

どのくらいの人にこのような症状が出るかはわかっていませんが、重い症状が出る場合があります。重い症状は、ワクチンを受けた後すぐに出るものと、すぐには出ないものがあります。

● すぐに出るもの (アナフィラキシーといいます)

- ひふのかゆみ、赤み、赤いぶつぶつ など
- おなかの痛み、吐き気、気持ちが悪くなる など
- 目がみえにくい
- せき、のどのかゆみ、息がしにくい など
- ふらふらする、体に力がはまらない など

症状が出る場合、**受けた後30分以内が多い**といわれていて、**受けてすぐに出る**こともあります。注射した後はすぐには帰らずに、ワクチンを受けた病院などでしばらくゆっくりしましょう。

● すぐには出ないもの (心筋炎、心膜炎といいます)

- むねがズキズキする・ドキドキする、手足や顔がぷっくりする、
体が重い・だるい、息がしにくい、ゼーゼーする、ハアハアする

このような症状が出たらすぐに周
ほかにも、体の調子に何か気になることがあったら、お母さん、

う あと で しょうじょう 受けた後に出るかもしれない症状

ます。また、とてもめずらしいことですが、重い症状が出ることもあります。

う あと で しょうじょう 受けた後に出るかもしれない症状

ワクチンを受けた人の20人に1人以上に、次のような症状が出るといわれています。

- ワクチンを注射した部分の痛み、赤み、はれ
- 頭あたまが痛い
- げりおなかがごろごろする
- 体からだが痛い
- 体が重い・だるい、寒気さむけがする（ゾクゾクする）、熱ねつが出る

「ワクチンを注射した部分の痛み」が出る場合、
ワクチンを受けた日に痛みが出て、その痛みは2日間ふつかかんくらい続くことが多いといわれています。
そのほかの症状しょうじょうも、数日すうじつでよくなるといわれています。



りの大人おとなの人に知らせましょう。
お父さん、周りの大人おとなの人にすぐに知らせることが大切です。