

Q8. 新型コロナウイルスmRNAワクチン接種後に報告されているギラン・バレー症候群では、どのような症状が認められますか？また、症状を認めた場合は、どうすればいいですか？

A8

ギラン・バレー症候群では、歩行時につまずく、階段を昇れない、手足（特に足）に力が入らない、物がつかみにくい、手足がしびれる、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉が麻痺する、食べ物が飲み込みにくい、呼吸が苦しいなどの症状があらわれます。ギラン・バレー症候群は、初期には軽症と考えられても急速に悪化することがあります。ギラン・バレー症候群が疑われる症状が認められた場合には、早い段階で医師等に相談するようにしてください。その際、本ワクチンを接種したことやいつ接種したのかなどを伝えるようにしてください。

Q9. ワクチン接種後に発熱しました。どのように対応したらいいのでしょうか？

A9

ワクチン接種後の発熱に対しては、日本小児科学会より、成人の場合と同様に発熱の程度に応じて解熱鎮痛薬を使用できることが示されています。ただし、小児には推奨されない解熱鎮痛薬もありますので注意してください。ご不安な場合は都道府県の相談窓口や、かかりつけ医にご相談ください。

Q10. 6ヵ月未満でも本ワクチンを接種できますか？

A10

本ワクチンの接種対象は6ヵ月以上の方です。なお、6ヵ月未満の方に対する有効性・安全性はまだわかっていません。

Q11. 1回目の接種時には11歳でしたが、2回目の接種前に12歳の誕生日がきました。5～11歳用と12歳以上用、どちらのワクチンを接種すればいいのでしょうか？

A11

5～11歳においては、1回目接種時の年齢に基づいて使用するワクチンが決定されます。

1回目接種時に11歳であったお子さまは、2回目の接種までに12歳になった場合であっても、2回目も5～11歳用のワクチンを接種します。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(8.3版)より抜粋(<https://www.mhlw.go.jp/content/000971375.pdf>)

こちらの情報は更新される可能性があります。

19ページに記載の二次元コードより最新の内容をご確認ください。

Q12. なぜ6ヵ月～4歳の初回免疫では、3回の接種が必要なのですか？

A12

6ヵ月～4歳の小児に対する本ワクチンの3回目の接種から1ヵ月後の新型コロナウイルスに対する中和抗体価は、16～25歳へのワクチン接種と同様という試験結果より、3回の接種が必要となります。

Q13. 本ワクチン接種の1回目と2回目の間隔が、3週間以上空いてしまった場合は、どのようにすればいいですか？

A13

できる限り速やかに2回目の接種を受けてください。

Q14. 6ヵ月～4歳で、本ワクチン接種の2回目と3回目の間隔が、8週間以上空いてしまった場合は、どのようにすればいいですか？

A14

できる限り速やかに3回目の接種を受けてください。

Q15. 6ヵ月～4歳で、2回目接種から8週間経過する前に3回目の接種を受けてもいいですか？

A15

6ヵ月～4歳のお子さまは、2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に、3回目の接種を受けてください。

Q16. 本ワクチンの追加免疫の接種はどのような人が対象ですか？

A16

5～11歳のお子さまは、2回目の接種から少なくとも5ヵ月を経過した後に、追加免疫としての3回目接種を受けることができます。各自治体からの案内をご確認ください。なお、6ヵ月～4歳の方は追加免疫(4回目)の接種を受けられません。6ヵ月～4歳の方の追加免疫の接種については、必要性含め今後さらなる情報が得られる予定です。

Q17. 1回目の接種で重篤な副反応が認められ、医師より2回目に同じワクチンを接種することが困難と言われました。2回目の接種を受けることはできないですか？

A17

国内では、6ヵ月～11歳の方を接種対象としているのは本ワクチンのみですので、2回目の接種を受けることができません。

よくある質問

Q18. 転居や新型コロナワクチンの流通減少等により1回目に接種を受けた新型コロナワクチンと同じワクチンを2回目に受けることが困難です。どのようにすればいいですか？

A18 国内では、6ヵ月～11歳の方を接種対象としているのは本ワクチンのみですので、2回目の接種を受けることができません。

Q19. 小児や乳幼児で、ワクチンを接種する部位は変わりますか？

A19 1歳未満のお子さまは、太もも外側に接種します。1～2歳のお子さまは、太もも外側もしくは肩(三角筋)に接種します。3歳以上のお子さまは、肩(三角筋)に接種します。ただし、明らかに筋肉量が少ない場合などは、年齢に関係なく太もも外側に接種することもあります。

Q20. 新型コロナワクチンと、他のワクチンの接種を同時に受けることはできますか？

A20 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。インフルエンザワクチン以外のワクチンとの同時接種はできません。互いに、片方のワクチン接種を受けてから2週間後に接種を受けることができます。特にお子さまは、定期接種で他のワクチン接種を受けることもありますのでご注意ください。

Q21. 新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチンの接種に関するお知らせを確認するには、どのようにすればいいですか？

A21 厚生労働省のホームページ(<https://www.mhlw.go.jp/>)に新型コロナウイルスやワクチンについての情報が公表されています。

Q22. 接種したワクチンの有効期限はどのように確認できますか？

A22 本ワクチンの有効期限は、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とご家族の方々のためのサイト」にて公開しています。下記の二次元コードよりアクセスし、接種券に記載されている「製造番号」(=ロットNo)ごとの有効期限をご参照ください。



6ヵ月～4歳用



5～11歳用

本ワクチンに関するさらなる情報について

ワクチン接種の考え方について

新型コロナウイルスは変異を繰り返しており、それに伴い重症化率やワクチンの予防効果などにも変化が生じています。小児における最新情報は、厚生労働省のQ&Aや日本小児科学会のホームページをご確認ください。

厚生労働省新型コロナウイルスQ&A:<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>
日本小児科学会:<https://www.jpeds.or.jp/>

情報提供サイトのご案内

本ワクチンに関する情報について、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」にて公開しております。

同サイトでは、本ワクチンを接種されるお子さまの保護者の方へ向けた「新型コロナワクチン接種を検討されているお子さまの保護者の方へ」や、12歳以上の方に関する情報をまとめた「コミナティを接種される方とそのご家族へ」もご覧いただくことができます。



左の二次元コードもしくは
下記URLよりアクセスし、ご参照ください。

<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp>

本資料に掲載されている内容は、変更される可能性があります。
最新の情報は下記二次元コードよりご確認ください。



う あと まも ワクチンを受けた後も守ってほしいこと



しんがた う からだ
新型コロナワクチンを受けることで、ウイルスが体にはいつても

しんがた
新型コロナにかかりにくくなりますが、

ぜったい からだ
絶対にウイルスが体にはいつてもなくなるというわけではありません。

う あと いか てん ちゅうい す たいせつ
ワクチンを受けた後も、これまでのように、以下の点にしっかりと注意しながら過ごすことが大切です。

ちゅうい
3つの密(みつ)に注意

しんがた
新型コロナにかからない・
うつさないためにできること

ひと ひと きょり ちか
人と人の距離が近い(みっせつ)



ひと ばしよ
人がたくさんいる場所
(みっしゅう)



でい くち まど
出入り口や窓が
閉まった場所
(みっぺい)

てあら
手洗い・うがい



つ
マスクを着ける



たいちよう わる
体調が悪いときは
がいしゅつ とうこう
外出・登校しない

BIONTECH

Pfizer

製造販売元：ファイザー株式会社

新型コロナワクチン コミナティは、ビオンテック独自のmRNA技術を基にビオンテックとファイザーにより共同開発された
修飾ヌクレオチドmRNAワクチンです。