

## mRNAワクチンに関するQ&A

### Q1 mRNAには長期的な体への悪影響はないの？

**A1** mRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、mRNAは、人の遺伝情報（DNA）に組み込まれるものではありません。体の中で、DNAからmRNAが作られる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNAは作られません。こうしたことから、mRNAを注射することで、その情報が長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられています。

参考文献  
厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A  
<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html> (最終アクセス：2022年10月11日)

### Q2 変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか？

**A2** 一般論として、ウイルスは絶えず変異を起こしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるというわけではありません。それぞれの変異株に対するワクチンの有効性がどのくらいあるのかについても、確認が進められています。最新情報は、厚生労働省のQ&Aや日本小児科学会のホームページをご確認ください。

参考文献  
厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A  
<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0012.html> (最終アクセス：2022年10月11日)

## 本ワクチンの安全性(副反応)

(海外データ)

小児への本ワクチン接種においても、副反応の種類や発現頻度は成人と大きな違いはありませんでした。

小児では、成人に比べて副反応による心身の負担が大きかったり、自分でうまく伝えられなかったりすることも考慮し、接種への立ち会いおよびその後も、お子さまの様子に変わりがないか観察してください。

臨床試験では、小児への本ワクチン接種によって、主な副反応として、下記のような症状があらわれました。5～11歳の小児では、注射した部位の痛みは、接種したその日にあらわれ、2日程度続くことがあります。その他の副反応は、接種した次の日にあらわれ、1日程度続くことがあります。6ヵ月～4歳の小児では、注射した部位の痛みは、接種したその日にあらわれ、1日程度続くことがあります。その他の副反応は、接種した次の日～5日程度であらわれ、2日程度続くことがあります。

あらわれた頻度	副反応の種類	
	6ヵ月～4歳	5～11歳
50%以上	イライラ*	注射した部位の痛み、疲労
20～50%	注射した部位の痛み、眠気、食欲減退、疲労	注射した部位の発赤・紅斑、腫れ、頭痛
5～20%	注射した部位の発赤・紅斑、腫れ、頭痛、筋肉痛、寒気、発熱、下痢、嘔吐	筋肉痛、関節痛、寒気、発熱、下痢

※接種によるストレスや刺激によって、ささいなことで不機嫌になりやすくなります。

承認時評価資料

接種後(特に、接種直後～数日間)はお子さまの体調に注意してください。

お子さまに、上記のような症状や、いつもと違う体調の変化や異常があれば、接種を受けた医療機関などの施設の医師、看護師またはかかりつけ医へ相談してください。

その他の副反応、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎やギラン・バレー症候群などに関する注意については、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とご家族の方々のためのサイト」(サイトのURLは裏表紙をご参照ください)、小冊子「新型コロナウイルスワクチン コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ」もご確認ください。

## 本ワクチンの有効性

(海外データ)

小児への本ワクチン接種においても、新型コロナウイルスに対する中和抗体の量(抗体価)は成人と同様であったことが確認されています。

5～11歳および6ヵ月～4歳の小児において、初回免疫(5～11歳は2回、6ヵ月～4歳は3回)のワクチン接種から1ヵ月の新型コロナウイルスに対する中和抗体価は、16～25歳の成人における初回免疫(2回)のワクチン接種から1ヵ月の中和抗体価と同様でした。

承認時評価資料

## ワクチン接種を受けた後もお子さまに守ってほしい大切なこと

(保護者の方からお子さまにお伝えください)

ワクチン接種を受けた、受けていないといったことで、**差別的な扱いをすることはあってはなりません。**

ワクチン接種を受ける、受けないはあくまでご本人、保護者の意思に基づくものです。ワクチン接種を受けた、受けていないといった理由で、お友達や周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることがないように、お子さまとのコミュニケーションをお願いいたします。



ワクチン接種を受けた後も、**基本的な感染予防対策を続けることが大切です。**

本ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防するものです。本ワクチン接種後も基本的な感染予防対策(マスク着用、密集、密接および密閉の回避、手洗いや咳エチケットなど)が必要です。これらの点をお子さまにお伝えください。



## 本ワクチンに関するさらなる情報について

本ワクチンに関する情報について、「ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とご家族の方々のためのサイト」にて公開しております。

同サイトでは、「新型コロナウイルスワクチン コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ」もご覧いただくことができます。

### ファイザー新型コロナウイルスワクチンの 接種を受ける方とご家族の方々のためのサイト

下記のURLもしくは二次元コードよりご参照ください。

<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp>



**BIONTECH**



製造販売元：ファイザー株式会社

新型コロナウイルスワクチン コミナティは、ビオンテック独自のmRNA技術を基にビオンテックとファイザーにより共同開発された修飾ヌクレオシドmRNAワクチンです。